

ガーデン-造園

ビオトープレポート

敷地に配置されている植栽から野鳥・チョウの誘引一覧表が作成できます。

写真付きで、生態がわかります。

▽ビオトープレポート


種名	写真	説明	誘引植物
アサギ		アサギは、アサギ科のチョウで、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。アサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。	アサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。
キアサギ		キアサギは、アサギ科のチョウで、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。	キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。
キアサギ		キアサギは、アサギ科のチョウで、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。	キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。
キアサギ		キアサギは、アサギ科のチョウで、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。	キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。

種名	写真	説明	誘引植物
キアサギ		キアサギは、アサギ科のチョウで、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。	キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。
キアサギ		キアサギは、アサギ科のチョウで、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。	キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。
キアサギ		キアサギは、アサギ科のチョウで、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。	キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。
キアサギ		キアサギは、アサギ科のチョウで、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。	キアサギ科のチョウは、アサギ科のチョウの中で最も大きな種です。

対象植物が表示されます。

▽ビオトープレポート（野鳥一覧表 / チョウ一覧表）の作成

1) 平面図上に植栽を配置します。



ガーデン-造園

2) メニュー[環境評価]―[野鳥一覧表]または[チョウ一覧表]をクリックします。



3) 一覧表を配置したい場所でクリックしますと一覧表が作成されます。



鳥名	写真	特徴	記録方法
ヒヨドリ		普通な鳥類。庭園に多く見られる。主に雑草や低木に巣を作る。繁殖期には、雄鳥が縄張りを守る。冬は群れを成して行動する。	観察・写真撮影・音声録音・採卵・採卵後
キリンジ		普通な鳥類。庭園に多く見られる。主に雑草や低木に巣を作る。繁殖期には、雄鳥が縄張りを守る。冬は群れを成して行動する。	観察・写真撮影・音声録音・採卵・採卵後
セキレイ		普通な鳥類。庭園に多く見られる。主に雑草や低木に巣を作る。繁殖期には、雄鳥が縄張りを守る。冬は群れを成して行動する。	観察・写真撮影・音声録音・採卵・採卵後
ムクドリ		普通な鳥類。庭園に多く見られる。主に雑草や低木に巣を作る。繁殖期には、雄鳥が縄張りを守る。冬は群れを成して行動する。	観察・写真撮影・音声録音・採卵・採卵後

ガーデン-造園




一覧表を削除するには？

作成した一覧表を削除するには矢印ツールで一覧表を選択し、キーボードの[Delete]または[BackSpace]キーを押します。

▽野鳥一覧表/チョウ一覧表の編集

作成した一覧表から不要な項目のみを削除することができます。

1) 矢印ツールで一覧表をクリックし、選択状態にします。



名前	画像	説明	削除ボタン
コノハシ		コノハシは、日本各地に分布する。主に山間部や森林に生息する。繁殖期には、雄が雌に向かって縄張り行動を示す。餌は主に昆虫や果実を食べる。	
ホシシタビ		ホシシタビは、日本各地に分布する。主に山間部や森林に生息する。繁殖期には、雄が雌に向かって縄張り行動を示す。餌は主に花蜜を食べる。	
コノハシ		コノハシは、日本各地に分布する。主に山間部や森林に生息する。繁殖期には、雄が雌に向かって縄張り行動を示す。餌は主に昆虫や果実を食べる。	
ツグミ		ツグミは、日本各地に分布する。主に山間部や森林に生息する。繁殖期には、雄が雌に向かって縄張り行動を示す。餌は主に昆虫や果実を食べる。	
メジロ		メジロは、日本各地に分布する。主に山間部や森林に生息する。繁殖期には、雄が雌に向かって縄張り行動を示す。餌は主に昆虫や果実を食べる。	
ムクドリ		ムクドリは、日本各地に分布する。主に山間部や森林に生息する。繁殖期には、雄が雌に向かって縄張り行動を示す。餌は主に昆虫や果実を食べる。	

2) グループの有効化/グループの一時解除ボタンで、グループの一時解除を行います。



グループの一時解除

ガーデン-造園

3) 一度選択を解除し、再度削除したい項目を選択し、キーボードの[Delete]または[BackSpace]キーを押します。

写真	写真	説明	削除項目
ヒヨドリ		ヒヨドリは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目
スズメ		スズメは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目
シジュウカラ		シジュウカラは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目
ツグミ		ツグミは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目
メジロ		メジロは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目
ムクドリ		ムクドリは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目




写真	写真	説明	削除項目
ヒヨドリ		ヒヨドリは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目
スズメ		スズメは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目
シジュウカラ		シジュウカラは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目
ツグミ		ツグミは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目
メジロ		メジロは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目
ムクドリ		ムクドリは、日本全国に分布する。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。主に農田や畑、雑草の多い場所を好む。	削除項目

4) 一覧表の先頭や途中に列名を入れる場合、列名を挿入したい項目を矢印ツールで選択し、右クリック→[選択したオブジェクトの設定]をクリックします。

The screenshot shows a table with columns for '写真' (Photo), '写真' (Photo), '説明' (Description), and '削除項目' (Delete item). The table lists various birds like ヒヨドリ, スズメ, シジュウカラ, ツグミ, メジロ, and ムクドリ. A context menu is open over the table, showing options like '選択したオブジェクトの設定' (Settings for the selected object), 'ツールの選択を有効にする' (Enable tool selection), '切り取り(Z)' (Cut), 'コピー(C)' (Copy), '貼り付け(P)' (Paste), '削除' (Delete), '移動とコピー' (Move and Copy), '表示順序' (Display Order), 'レイヤー' (Layer), '層で切り取り(1)...' (Cut by layer), '3Dで選択内容/矩形選択を表示' (Show selection content/rectangular selection in 3D), '3Dで全てを表示' (Show everything in 3D), '選択範囲四角で拡大(Z)' (Zoom in with selection rectangle), and '全ての選択を解除' (Deselect all).

5) [選択したオブジェクトの設定]画面が開きます。画面右側の「パラメータ」の「列名の有無」を“なし”から**あり**に変更し[OK]をクリックします。

ガーデン-造園



6.列名が表示されます。

鳥名	写真	特徴	対応策
ビロウドリ		冬鳥。日本に定住する。繁殖期は5月～7月。繁殖場所は、海岸の砂浜や岩場、樹林帯など。繁殖場所は、海岸の砂浜や岩場、樹林帯など。繁殖場所は、海岸の砂浜や岩場、樹林帯など。	繁殖期には、繁殖場所を監視し、侵入者を退避させる。繁殖期には、繁殖場所を監視し、侵入者を退避させる。繁殖期には、繁殖場所を監視し、侵入者を退避させる。
ホシシロガサ		冬鳥。日本に定住する。繁殖期は5月～7月。繁殖場所は、海岸の砂浜や岩場、樹林帯など。繁殖場所は、海岸の砂浜や岩場、樹林帯など。繁殖場所は、海岸の砂浜や岩場、樹林帯など。	繁殖期には、繁殖場所を監視し、侵入者を退避させる。繁殖期には、繁殖場所を監視し、侵入者を退避させる。繁殖期には、繁殖場所を監視し、侵入者を退避させる。

[illegible]

登録されている画像を他ソフトへ転用・使用することは禁止します。

ガーデン-造園

▽参考文献

植栽評価機能・ビオトープレポート機能以下の参考文献をもとに算出式を推定しています。

<参考文献>

藤原宣夫・山岸裕・村中重仁（2002）
都市緑化樹木によるCO2固定量の算定方法に関する研究 日本緑化工学会誌
独立行政法人森林総合研究（2004）
森林、海洋等におけるCO2収支の評価の高度化
森林総合研究所交付金プロジェクト研究成果集3
公害健康被害補償予防協会（2003） 大気浄化植樹マニュアル
林野庁計画課（1985） 立木幹材積表 東日本編
平井信二（1996） 木の大百科 朝倉書店
叶内拓哉 高野伸二 フィールド図鑑 野鳥小図鑑 東海大学出版
中村登流 検索入門 野鳥の図鑑 陸の鳥 保育社
叶内拓哉 浜口哲一 山溪フィールドブックス 野鳥 山と溪谷社
叶内拓哉 野鳥と木の実ハンドブック 文一総合出版
柚木修 柚木陽子 野鳥を呼ぶ庭づくり 千早書房
藤本和典 BIRDER スペシャル 庭に鳥を呼ぶ本 文一総合出版
渡辺康之 検索入門 チョウ 保育社
海野和男 花と蝶を楽しむ バタフライガーデン入門 農文協
猪又敏男 松本克臣 山溪フィールドブックス 蝶 山と溪谷社
猪又敏男 原色蝶類検索図鑑 北隆館
日高敏隆 藤井恒 海野和男 今森光彦 フィールド図鑑 チョウ 東海大学出版

一意的なソリューション ID: #1164

製作者: 藤田

最終更新: 2018-06-19 13:53